

Część 2 - leki

Lp.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	Wazelina biała	szt.	6
2.	Oliwka dla dzieci	szt	2
3.	Preparat przeciw odleżynom, 100 ml przeznaczony do stosowania na skórę narażoną na ucisk i otarcia w celu zapobiegania podrażnieniom i stanom zapalnym. Jest także pomocny w przypadku już powstałych zmian na skórze wywołanych czynnikami mechanicznymi, chemicznymi jak również w oparzeniach I stopnia. Skład według INCI Butylene Glycol, Aqua, Panthenol, Aesculus Hippocastanum, Chamomilla Recutita, Rosmarinus Officinalis, Allantoin, Mentha Viridis.	szt	3
4.	Krem ochronny z arginina seni 200 ml	szt	3
5.	Natrium Chloratum 0,9%, (opakowanie 100 sztuk po 5ml) w opakowaniu plastikowym	op	3
6.	Natrium Chloratum 0,9%, (opakowanie 100 sztuk po 2ml, 5ml lub 10 ml) szklane ampułki	op	2
7.	0,9% NaCl, roztwór chlorku sodu, 10ml, 100 ampułek	op	3
8.	Natrium chloratum 0,9%, iniekcje płynne, 500 ml,	szt.	200
9.	Natrium chloratum 0,9%, iniekcje płynne, 250 ml	szt	200
10.	Natrium chloratum, 0,9%, iniekcje, KabiClear, 100 ml	szt	200
11.	Roztwór glukozy 5% (Glucosum) 50 mg/ml, roztwór do infuzji, 500 ml	szt	20
12.	Płyn Wieloelektrolitowy roztw. do inf. 500 ml	szt	100
13.	heparyna drobnocząsteczkowa 40 mg/0,4 ml, iniekcja, 10 ampułko-strzykawk	op	15
14.	Clexane 60 mg/0,6 ml, iniekcje, 10 ampułko-strzykawk	op	15
15.	gentamycyna iniekcje domięśniowe, 40 mg / 1ml, 10 ampułek	op	15
16.	gentamycyna roztw. do wstrz. i (lub) inf.(80 mg/2 ml) - 10 amp. 2 ml	op.	15
17.	czopki glicerynowe (opakowanie 10 szt)	szt	40
18.	kotoprofen iniekcje domięśniowe, 100 mg / 2 ml, 10 ampułek	op	15
19.	Furosemid roztw. do wstrz.(20 mg/2 ml) - 5 amp. 2 ml	op	15
20.	Furosemid tabl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10)	op	30
21.	Furosemid roztw. do wstrz.(20 mg/2 ml) - 50 amp.	op	6
22.	Kalium chloratum WZF 15% konc. do sporz. roztw. do inf.(150 mg/ml) - 10 fiolek 20 ml	op	30
23.	Lignocainum hydrochloricum 2% roztw. do wstrz.(20 mg/ml) - 5 fiolek 20 ml	op.	30
24.	Lignocainum hydrochloricum 1% roztw. do wstrz.(10 mg/ml) - 5 fiolek 20 ml	op	10
25.	Lignocainum hydrochloricum 1% roztw. do wstrz.(10 mg/ml) - 10 amp. 2 ml	op	10
26.	Metoclopramid 0,5% roztw. do wstrz.(10 mg/2 ml) - 5 amp. 2 ml	op	30
27.	Atropinum sulfuricum roztw. do wstrz.(0,5 mg/ml) - 10 amp. 1 ml	op	3
28.	Atropinum sulfuricum roztw. do wstrz.(1 mg/ml) - 10 amp. 1 ml	op	3

29.	deksamethason roztw. do wstrz.(4 mg/ml) - 10 amp. 1 ml	op	3
30.	metamizol roztw. do wstrz.(2,5 g/5 ml) - 5 amp. 5 ml	op	8
31.	metamizol roztw. do wstrz.(1 g/2 ml) - 5 amp. 2 ml	op	12
32.	Adrenalina 0,1% roztw. do wstrz.(1 mg/ml) - 10 amp. 1 ml	op	10
33.	lek odbudowujacy florę jelitową proszek do sporz. zaw. doustnej(10 mld CFU) - 10 fiolek szklanych	op	4
34.	Injectio Magnesii sulfurici 20% roztw. do wstrz.(2 g/10 ml) - 10 amp. 10 ml	op	30
35.	Natrium bicarbonicum 8,4% roztw. do wstrz.(84 mg/ml) - 10 amp. 20 ml	op	10
36.	amiodaron roztw. do wstrz.(150 mg/3 ml) - 5 amp. 3 ml	op	15
37.	drotaweryna ampułki roztw. do wstrz.(40 mg/2 ml) - 5 amp. 2 ml	op	15
38.	pentoksyfilina konc. do sporz. roztw. do inf.(300 mg/15 ml) - 10 amp. 15 ml	op	3
39.	cefazolina proszek do sporz. roztw. do wstrz.(1 g) - 1 fiolka	szt.	15
40.	Ketonal , 100 mg, tabletki powlekane, 30 szt	op	3
41.	Metoclopramid tabl.(10 mg) - 50 szt.	op	6
42.	Nitrendypina tabl.(10 mg) - 30 szt. (2 blistry x 15)	op	2
43.	Nitrendypina tabl.(20 mg) - 30 szt. (2 blistry x 15)	op	2
44.	kaptopryl tabl.(12,5 mg) - 30 szt.	op	2
45.	kaptopryl tabl.(25 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10)	op	2
46.	Paracetamol 500 mg, tabletki, 20 szt.	op	2
47.	rutozyd (Rutosidum) i kwas askorbowy (Acidum ascorbicum). tabletki powlekane, 150 szt.	op	2
48.	Witamina C, 200 mg, tabletki powlekane, 50 szt.	op	2
49.	Witamina C 100mg, 50 drażetek	op	2
50.	nawilżające krople do oczu 5ml	szt	30
51.	Krople do nosa krople do nosa 10 ml	szt	2
52.	Krople do ucha	szt	12
53.	Szybko działający preparat do dezynfekcji sprzętu medycznego (powierzchni w spreju butelka 1l)	szt	6
54.	płyn do odkażania skóry1 L.	szt	6
55.	alkoholowy żel do dezynfekcji rąk 5L	szt	3
56.	płyn do odkażania błon śluzowych, 500 ml	szt	6
57.	płyn do odkażania błon śluzowych i skóry 50 ml. (z atomizerem)	szt	3
58.	Preparat do odkażania skóry przed iniekcją 350 ml. (z atomizerem)	szt	24
59.	roztwór do stosowania w jamie ustnej na afty	szt	4
60.	Maść witaminowa	szt	3
61.	Maść do stosowania miejscowego na skórę substancje czynne: 20mg alantoiny i 50mg deksopantenolu (50% roztwór pantenolu w glikolu propylenowym) oraz substancje pomocnicze: lanolinę, parafinę ciekłą, wazelinę białą, etylu parahydroksybenzoesan, wodę oczyszczoną.	szt	3

62.	lidokaina 2%, żel, , 30 g	szt	30
63.	żel z lidokainą i chlorhexydyną - ampułkostrzykawka a'25	op	10
64.	Spirytus salicylowy, 2% płyn, 100 g	szt.	30
65.	preparat wykazujący działanie ściągające, przeciwobrzękowe i przeciwbólowe. Tabletki do sporządzenia roztworu - stosowanie miejscowe na obrzęknięte części ciała 6 szt.	op	30